AIRONE CENERINO (*Ardea cinerea*) - Grey heron

Famiglia: Ardeidi

Caratteristiche

E' l'airone più comune nella regione Paleartica, di grosse dimensioni: 90-98 cm di lunghezza, 1 metro di altezza ed apertura alare che nel maschio raggiunge i 2 metri.

La testa è bianca con piume nere che dall'occhio si estendono dietro la nuca, il becco e le zampe sono giallastri mentre la gola e il collo di colore bianco sporco sono attraversati da due strie longitudinali nere che si perdono nel petto; i fianchi sono grigi con bordo nero e il mantello è grigio-cenere (da cui il nome). Le *egrettes* (= lunghe piume filiformi presenti sulla nuca, tipiche del piumaggio nuziale) sono molto lunghe.

Habitat e comportamento

Specie migratrice, sverna regolarmente in molte zone adatte della penisola.

Predilige zone alberate lungo rogge, fiumi e canali naturali con abbondante vegetazione spondale o zone di acqua ferma come laghi, stagni, risaie, prati allagati e coste marine.

Ha un volo maestoso, con battiti d'ala lenti e profondi, a zampe distese dietro il corpo, testa e collo incassati tra le spalle.

Rimane immobile a lungo nell'acqua bassa in attesa della preda, che cattura con un rapidissimo colpo del lungo becco, giallo e robustissimo. Si nutre principalmente di pesci, anfibi, piccoli rettili e mammiferi, oltre che di insetti e crostacei.

Nidifica in colonie chiamate *garzaie*; il grande nido è formato da stecchi e rametti e situato in genere su alberi alti almeno 15-20 metri. Depone mediamente 4-5 uova, covate da entrambi i genitori per circa 25 giorni, e i piccoli volano a circa 50 giorni.

www.foto-natura.it

www.parco.ogliosud.it

FALCO PECCHIAIOLO (*Pernis apivorus*) - Honey buzzard

Famiglia: Accipitridi

Caratteristiche

E' un *rapace* di medie dimensioni, lungo 50-60 cm, con apertura alare fino a 150 cm.

E' molto simile alla poiana, da cui si distingue per le ali più larghe e squadrate, il collo più allungato e la testa più piccola.

Il piumaggio è estremamente variabile (come quello della poiana), ma spesso è distinguibile in volo per la presenza di due evidenti macchie scure carpali e per la coda con un'ampia banda terminale scura.

Habitat e comportamento

Specie migratrice transahariana, trascorre l'inverno nella zona tropicale dell'Africa.

Vive in ambienti boscosi alternati a spazi aperti.

Molto agile in volo, anche a quote medio-basse, si muove con destrezza anche sul terreno, dove caccia gli insetti; si nutre principalmente di larve e adulti di imenotteri (in particolare vespe e bombi) ma anche rettili, anfibi, roditori, oltre che del miele contenuto nei favi, i quali possono essere trasportati nel nido durante l'allevamento dei piccoli.

Per la nidificazione necessita di boschi ad alto fusto sia di latifoglie che di conifere in quanto costruisce il nido sugli alberi a 10-20 metri d'altezza; spesso utilizza il nido di altre specie. Depone in maggio-giugno 1-2 uova che entrambi i genitori covano per circa un mese; i piccoli faranno il primo volo dopo circa 5 settimane e saranno indipendenti dopo 3 mesi.

www.cuneobirding.it

www.regione.sicilia.it

POIANA (*Buteo buteo*) - Common buzzard

Famiglia: Accipitridi

Caratteristiche

E' il *rapace* europeo più comune ed a più ampia diffusione.

Ha grandi dimensioni: la lunghezza è pari a 53 cm nei maschi e 56 cm nelle femmine, mentre l'apertura alare è di 117-137 cm.

Il piumaggio ha colorazione estremamente variabile che va dal bianco a un marrone molto scuro. Le ali sono larghe, la coda corta e lunga con diverse strisce sottili trasversali e una striscia terminale più larga; ha il sottoala di colore chiaro, con macchia carpale scura.

Habitat e comportamento

Specie migratrice regolare, svernante e sedentaria, nidificante.

Vive prevalentemente in ambienti boscosi prossimi a radure e campi, sia in collina sia in montagna, fino a 1.800 m di quota nei boschi di larice, mentre in pianura nidifica nei pioppeti maturi; in inverno si ritrova anche in brughiere, pianure e ampie zone aperte.

Il cibo è molto vario: predilige piccoli roditori e altri piccoli mammiferi, soprattutto conigli, ma si nutre anche di rettili, anfibi, insetti, uccelli e talvolta di carogne. La poiana caccia rimanendo appostata su un posatoio oppure, in presenza di idonee correnti d'aria, caccia in volo facendo il cosiddetto "spirito santo" in quanto riesce a stazionare nello stesso punto tenendosi controvento. Controlla un territorio di circa 5-6 km di raggio dal nido.

Il nido è ampio e costruito su alberi o dirupi con bastoni, rametti e steli, rivestito di soffice materiale vegetale costantemente rinnovato.
La femmina depone 2-6 uova e le cova per circa 35 giorni; i piccoli sono in grado di nutrirsi da soli dopo 30 giorni e si involano a 40-45 giorni.

www.andreavellani.it

www.digitalwildlife.co.uk

COLOMBACCIO (*Columba palumbus*) - Woodpigeon

Famiglia: Columbidi

Caratteristiche

È la più grande, più frequente e più diffusa specie di colombi in Europa.

E' lungo 40-42 cm e l'apertura alare è pari a 75-80 cm; può pesare dai 460 ai 570 grammi.

La testa e la schiena sono bluastri, la coda e la punta delle ali scure, mentre il petto è di un colore rosa-grigio un pò più chiaro. Il collo ha una colorazione verdastra con le tipiche macchie bianche laterali che ne permettono il riconoscimento. Durante il volo sulla parte superiore delle ali si possono osservare le ampie fasce trasversali bianche che sono il principale carattere di riconoscimento dalle specie simili (piccione comune e colombella).

Habitat e comportamento

Specie stanziale e migratrice: oltre ad un numero ridotto di individui sedentari, a basse altitudini e con poche precipitazioni nevose, si osserva un numero variabile di individui migratori.

Vive nei boschi planiziali e collinari, nelle campagne coltivate ed alberate, ma anche in giardini e parchi urbani.

Si nutre essenzialmente di vegetali, ovvero semi, bacche, foglie, erba, radici, e in primavera integra la sua dieta con piccoli invertebrati; in autunno e in inverno mangia soprattutto ghiande e faggiole.

Il nido è semplice ed esile, costruito con paglia e rametti, sul ramo di un albero, vicino al tronco, ad una decina di metri di altezza. Depone 1-2 uova una o due volte all'anno tra marzo e novembre; i piccoli nascono dopo 17 giorni, vengono nutriti direttamente dal gozzo dei genitori con il *pastone*, una sorta di cibo digerito (comunemente chiamato latte di piccione), e abbandonano il nido dopo 3-4 settimane.

www.provincia.grosseto.it

www.hlasek.com

CUCULO (*Cuculus canorus*) - Cuckoo

Famiglia: Cuculidi

Caratteristiche

È lungo 30-34 cm, ha un'apertura alare di 55-60 cm e pesa poco più di un centinaio di grammi.

Il suo abbondante piumaggio nel maschio adulto è grigio-azzurro nella parte superiore e sul capo mentre nei giovani e nelle femmine ha un colore bruno-ruggine; nella parte inferiore è più chiaro con strisce trasversali scure. La coda è lunga e le ali piuttosto appuntite.

Habitat e comportamento

È un uccello migratore che arriva nelle nostre regioni in marzo-aprile. Gli adulti partono in giugno-luglio, i giovani invece in agosto-settembre e, senza essere guidati dagli adulti, riescono a raggiungere le foreste tropicali dell'Africa dove trascorrono l'inverno.

Animale solitario, può essere individuato grazie al suo canto caratteristico; in volo sembra un piccolo rapace.

Vive in ogni ecosistema fino a 1.500 m di quota, preferendo i boschi di collina e pianura, in particolare quelli luminosi con un ricco sottobosco.

Si nutre di insetti, bruchi pelosi (anche della processionaria), ragni, molluschi e vermi.

La sua caratteristica è di essere un uccello *parassita*: non nidifica, in quanto ogni femmina sorveglia un vasto territorio alla ricerca di nidi in costruzione e nel momento della posa delle uova da parte dell'uccello proprietario (circa una cinquantina di specie di Passeriformi) toglie un solo uovo e vi depone il suo, di colore e dimensione molto simili; in un paio di giorni depone 15-20 uova in altrettanti nidi. Dopo 12 giorni l'uovo del cuculo si schiude, generalmente prima degli altri, e il pulcino, ceco e nudo, espelle dal nido le uova ed eventualmente anche gli altri pulcini. Rimasto solo, verrà nutrito e allevato dagli uccelli proprietari per circa 3 settimane.

www.provediemozioni.it

www.naturfoto.cz

SUCCIACAPRE (*Caprimulgus europaeus*) - Nightjar

Famiglia: Caprimulgidi

Caratteristiche

Deve il suo nome ai pastori che, vedendolo posarsi in mezzo al bestiame per cercare insetti, credevano succhiasse il latte delle capre.

Raggiunge la lunghezza di 26 cm ed ha un piumaggio di colore grigio-bruno, fittamente macchiettato e striato di fulvo e nero-bruno che lo rende altamente *mimetico*; i maschi hanno evidenti macchie bianche sulle penne.
Il becco è piccolo e corto ma l'apertura boccale è molto ampia in modo da poter catturare in volo il maggior numero di insetti.

Habitat e comportamento

È un uccello migratore che sverna in Africa e India nord-occidentale.

Vive esclusivamente in spazi aperti con alberi radi, arbusti e prati sfalciati, ovvero in boscaglie alternate a radure, mentre evita boschi chiusi di latifoglie; alcune popolazioni si sono insediate in giovani impianti di conifere.
In genere dorme sul terreno, di rado sui rami degli alberi.
I suoi predatori sono la volpe, la donnola, la faina e i rapaci notturni e diurni.

Di abitudini crepuscolari e notturne, si alimenta in volo catturando insetti notturni (falene, zanzare, moscerini, maggiolini). Oppure si posa al suolo o su un ramo con buona visibilità da cui spicca voli molto irregolari per afferrare gli insetti che riesce a percepire nell'oscurità grazie ai suoi grandi occhi.

Cova 1-2 volte all'anno; la femmina depone 1-2 uova, a terra sotto i cespugli, che si schiudono dopo circa 17 giorni.

www.ebnitalia.it

www.ebnitalia.it

RONDONE (*Apus apus*) - Common swift

Famiglia: Apodidi

Caratteristiche

Nonostante il nome e la somiglianza non è una rondine, che appartiene ad un'altra famiglia.

Ha una lunghezza di circa 18 cm, apertura alare di 35-40 cm e piumaggio uniformemente nero, lucido e con gola biancastra.

Il corpo è lungo e affusolato e tipiche sono le lunghe ali *falciformi* e la coda cortissima e biforcuta. Essendo sempre in volo le zampe sono molto ridotte e quasi prive di mobilità, quindi inadatte per camminare a terra.

Habitat e comportamento

Compie una regolare migrazione in stormi numerosi verso l'Asia meridionale e l'Africa a sud del Sahara, impiegando pochissimo tempo per giungere a destinazione ed abbandonando in massa e nella stessa notte le città in cui ha nidificato.

E' tra i migliori volatori del regno animale e non si posa mai se non per deporre e covare le uova o imboccare i piccoli.

Ha pochi nemici naturali, tra cui il falco lodolaio.

Si nutre di piccolissimi insetti aerei che cattura nelle ore serali volando anche a grande altezza. Completano la sua alimentazione tafani, coleotteri, farfalle, zanzare, moscerini e libellule.

Costruisce il nido con materiale vegetale e piume impastate con la saliva glutinosa, sotto le tegole e le grondaie delle case e, più raramente, nelle cavità delle rocce e degli alberi. Depone 2-3 uova che vengono covate per circa 20 giorni da entrambi i genitori, i quali si occupano dell'allevamento dei piccoli per circa 40 giorni. Formano coppie stabili nel tempo.

www.hlasek.com

www.wikipedia.org

BALLERINA BIANCA (*Motacilla alba*) - White wagtail

Famiglia: Motacillidi

Caratteristiche

E' lunga 18 cm, ha il dorso e il groppone grigio chiaro, la nuca, la gola e il petto neri, le ali nerastre con una doppia barra chiara, il ventre bianco come la fronte ed i lati del capo. La coda è lunga con penne bianche e nere.

Passeriforme dalla forma slanciata ed elegante, ha un volo tipicamente ondulato e quando non vola muove continuamente la coda su e giù.

Habitat e comportamento

In Italia è comunissima in ogni regione e stazionaria; molte individui sono di passaggio e molti altri compiono brevi migrazioni in piccoli gruppi per svernare nelle zone calde d'Europa.

Vive in prati, campi, parchi e giardini di città ed in generale dove c'è presenza di acqua; evita le foreste d'alto fusto e le montagne oltre il limite della vegetazione arborea.

Si nutre di insetti, larve e crisalidi, che cerca lungo le rive, nel fango e nel letame Quando individua una preda si precipita su di essa con rapidità e la cattura con estrema sicurezza.

Nidifica da aprile ad agosto nelle cavità delle costruzioni, dei tetti, delle rocce, nella vegetazione fitta o nei vecchi nidi delle specie più grandi; apprezza anche le cassette nido artificiali. Il nido è costruito con ramoscelli, foglie, radici, muschio, erba, piume, peli e lana.
La prima covata avviene in aprile con 6-8 uova, la seconda in giugno con di 4-6 uova. La covata dura 11-13 giorni ed è affidata esclusivamente alla femmina, mentre all'allevamento partecipano entrambi i genitori. E' una specie monogama, tuttavia la coppia è legata solo per la durata della stagione di nidificazione e il successivo periodo di svernamento.

www.birds.it

www.ebnitalia.it

PETTIROSSO (*Erithacus rubecula*) - Robin

Famiglia: Turdidi

Caratteristiche

Piccolo passeriforme lungo 13-15 cm, con la fronte, i lati del capo, la gola ed il petto rosso-arancio (caratteristica da cui deriva il nome). Le parti superiori sono di un colore bruno oliva mentre l'addome è grigiastro; sia il becco che le zampe sono bruni. I giovani non hanno il petto arancio e presentano numerose macchie bruno-scure e fulve. Raggiunge un peso massimo di 16 grammi.

Habitat e comportamento

In Italia è stanziale ovunque; in inverno arrivano individui svernanti dal nord Europa.

E' una specie solitaria e spiccatamente territoriale.

Sul terreno si muove con una rapida successione di lunghi balzi; il volo è lento e breve.

Nei mesi estivi vive nei boschi di conifere e nei boschi cedui mentre in autunno si sposta nei parchi e nei giardini dei centri urbani alla ricerca di cibo.

Si nutre soprattutto di insetti e larve, lombrichi, semi e piccoli molluschi, integrando questa dieta con una grande quantità di bacche e piccoli frutti.

Il nido viene costruito dalla femmina con foglie e muschi esternamente, imbottito all'interno con piume e pelo, collocato in un cespuglio, in una cavità sul terreno o nel foro di un albero, ben nascosto.
Qui vengono deposte a fine aprile 5-6 uova, covate dalla femmina per 13-15 giorni; i piccoli abbandonano il nido dopo 2 settimane ma vengono nutriti dai genitori ancora per un certo tempo.

www.maudoc.com

www.maurolasca.it

CODIROSSO SPAZZACAMINO (*Phenicurus ochruros*) - Black redstart

Famiglia: Turdidi

Caratteristiche

Piccolo passeriforme lungo 14-15 cm.

Il piumaggio è nero fuliggine nel maschio, con evidente macchia alare bianca, coda di color rosso-ruggine, dorso grigio e testa nera con fronte bianca. La femmina ha invece dorso marrone scuro.

Habitat e comportamento

E' un migratore che sverna nelle regioni mediterranee, nell'Asia minore e nel Nord Africa. In Italia è residente, con spostamenti parziali invernali dalle zone di nidificazione verso la costa.

E' estremamente agile, vola agitando la coda mentre sul terreno si sposta a saltelli.

Durante la buona stagione vive per lo più sui monti, raggiungendo sulle Alpi la quota di 2.600 metri; con il sopraggiungere dell'inverno si sposta nelle pianure.

Insettivoro, si nutre soprattutto di mosche e farfalle che può catturare sul terreno saltellando o correndo, volando da posatoi verso le prede al suolo o prendendole in volo; aggiunge alla sua dieta anche numerose specie di bacche.

In montagna nidifica nelle fessure delle rocce, mentre in pianura anche nei fori dei muri, sui cornicioni e raramente nelle cavità di qualche albero.
Durante la nidificazione è territoriale. Depone 5-7 uova covate da entrambi i genitori.

www.azumia.org

www.azumia.org

MERLO (*Turdus merula*) - Blackbird

Famiglia: Turdidi

Caratteristiche

Lungo circa 25 cm, è caratterizzato da piumaggio nero lucente, becco e cerchio intorno agli occhi giallo-arancio vivo e zampe brune. La femmina ha le parti superiori color bruno scuro uniforme, le parti inferiori bruno-fulve con striature scure più o meno distinte, gola biancastra e becco bruno. Il maschio giovane ha il becco nerastro e il mantello marrone con le zampe bruno-scure mentre i maschi anziani sono grigiastri, con il becco giallo.

Habitat e comportamento

E' in genere un migratore ma in Italia è stanziale e dunque presente tutto l'anno.

Il suo habitat naturale è il bosco ma si adatta a vivere in tutti gli ambienti con presenza di vegetazione quali parchi e giardini urbani, siepi, frutteti e vigne, nonché zone coltivate, fino ad un massimo di 2.000 metri di quota. Vive in coppie isolate che si radunano in grandi stormi solo durante le migrazioni.

Sul terreno corre e saltella rapidamente, quando si posa tiene la coda aperta ed eretta e le ali quasi cascanti. Il volo è basso, di breve durata, diretto o solo leggermente ondulato.

E' onnivoro, si nutre principalmente di frutta; completano la sua alimentazione bacche, semi, lombrichi, insetti, ragni, millepiedi e piccoli molluschi.

Nidifica tra le siepi, i cespugli, sugli alberi o in semplici buche nel terreno. Il nido viene costruito dalla femmina, talvolta aiutata dal maschio che porta il materiale.
La femmina depone 3-5 uova che cova per 12-15 giorni. Verso il tredicesimo giorno di vita i piccoli, pur non essendo ancora in grado di volare, escono dal nido e si nascondono nei cespugli dove il padre continua ad assisterli per 2 settimane, mentre la madre inizia a costruire un secondo nido. Le coppie, che sono monogame, nell'anno portano a termine tre covate.

www.malawicichlidhomepage.com

www.birds.it

CAPINERA (*Sylvia atricapilla*) - Blackcap

Famiglia: Silvidi

Caratteristiche

E' lunga 14-16 cm, il maschio ha una colorazione grigio cenere con calotta nera (da cui deriva il nome) mentre le femmine sono brune con calotta rosso ruggine. Il becco e le zampe sono sempre grigio scure. I giovani hanno le parti superiori più fulve e le parti inferiori più giallastre. Si differenzia da altre specie simili per il 'cappuccio' molto ben delineato, che si prolunga fino all'occhio, e per l'assenza di qualsiasi chiazza bianca sulle penne timoniere.

Habitat e comportamento

Presente in tutta Europa, sverna nell'Europa meridionale e in Africa; in Italia è diffuso ovunque, più numeroso nei mesi invernali, soprattutto nel mezzogiorno e nelle isole.

E' un uccello vivace, vive tra il fogliame di alberi e cespugli ed è raro vederlo sul terreno dove si muove saltellando con impaccio. Il volo è breve e ondulato.

Vive nei boschi di latifoglie e conifere con fitto sottobosco, nelle boscaglie, nelle siepi, oltre che nei frutteti, sui muri ricoperti di edera, negli orti e nei parchi urbani. Frequenta anche i luoghi abitati, ma preferisce stabilirsi nei giardini con ricca vegetazione.

Si nutre di principalmente di insetti e larve, oltre che di frutta, bacche e granaglie.

Il piccolo nido viene costruito con materiale vegetale nei cespugli (anche spinosi), siepi e alberi, in genere alla biforcazione dei rami a meno di 2 metri dal suolo e ben nascosto.
La cova avviene 1-2 volte all'anno, la femmina depone 3-6 uova, covate sia dal maschio che dalla femmina per 13-15 giorni. I piccoli abbandonano il nido dopo 11 giorni ma continuano ad essere imbeccati per alcune settimane. Se la nidiata è minacciata uno dei genitori si finge ferito lasciandosi cadere a terra per richiamare su di sé l'attenzione del predatore, che verrà così sviato ed allontanato.

Maschio - www.maakjedagnatuurlijk.be

Femmina - www.moment.ee

CINCE (*Parus spp.*) - Tit

Famiglia: Paridi

All'interno del golf sono state censite 5 specie:

- Cincia bigia (*Parus palustris*)
- Cincia dal ciuffo (*Parus cristatus*)
- Cincia mora (*Parus ater*)
- Cinciarella (*Parus caeruleus*)
- Cinciallegra (*Parus major*)

Caratteristiche

Sono tutti piccoli uccelli (lunghezza massima: 15 cm della cinciallegra), paffuti, con il becco corto. I colori sono variabili con prevalenza di marrone per la cincia mora e la cincia bigia, blu per la cinciallegra e la cinciarella.

Habitat e comportamento

Ogni cincia ha esigenze ecologiche precise: la cincia dal ciuffo è strettamente legata alle conifere; la cincia mora preferisce le aghifoglie ma d'inverno vive anche nei boschi di latifoglie; cincia bigia, cinciarella e cinciallegra sono ubiquitarie e convivono nello stesso habitat.

La loro alimentazione è costituita da insetti e larve, oltre che semi, frutti e bacche.

Nidificano per lo più negli incavi degli alberi.

Parus ater - www.wikipedia.org

Parus cristatus - www.digimakro.de

Parus caeruleus - www.wikipedia.org

Parus major - www.wikipedia.org

GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*) - Jay

Famiglia: Corvidi

Caratteristiche

Lunga circa 34 cm, apertura alare di 53 cm, ha un bel piumaggio colorato: bruno-rossastro con coda nera, ali nere con macchie bianche e azzurre, groppone bianco e lunghe piume erettili striate di bianco e di nero sul capo. Sia il maschio che la femmina possono raggiungere un peso massimo di circa 190 grammi. E' dotata di un becco più corto della testa, piuttosto grosso e leggermente uncinato all'apice.

Habitat e comportamento

Presente in tutta l'Europa, in Italia è presente in tutta la penisola, stazionaria, talora di passo.

Si muove fra i rami con grande agilità, può essere preda dei rapaci quando esce dal bosco. Vola solitario o in piccoli gruppi ed è in grado di coprire lunghe distanze.

Vive nelle foreste miste di latifoglie con ricco sottobosco e in boschi di conifere; saltuariamente si osserva su terreni aperti, parchi o giardini prossimi ai boschi.

E' onnivora, con spiccata preferenza per le ghiande, oltre che per frutta e bacche; si nutre anche di uova, nidiacei e di animali di piccola taglia come roditori, insetti e lucertole.
Nasconde le ghiande nella corteccia degli alberi o nel suolo del sottobosco per creare una scorta per l'inverno; nella gola può trasportare fino a 9 ghiande. Tra la ghiandaia e la quercia c'è un mutuo rapporto: da un lato questo uccello affida alle ghiande il ruolo di riserva di cibo per l'inverno, dall'altro l'abitudine della ghiandaia di trasportare e seppellire le ghiande in luoghi distanti costituisce un mezzo di dispersione alla quercia.

Il nido è piatto e viene costruito con rami e fieno sugli alberi, ad un'altezza massima di 2 metri dal suolo. L'interno del nido viene rivestito di foglie, erba e muschio e vi vengono deposte 5-7 uova covate da entrambi i genitori per 16-17 giorni. I piccoli nascono dopo 16 giorni rimangono nel nido per altri 20 giorni. E' una specie monogama per tutta la vita.

www.ebnitalia.it

www.vogeldagboek.nl

PASSERA D'ITALIA (*Passer italiae*) - Italian sparrow

Famiglia: Passeridi

Caratteristiche

E' la specie di uccello più comune d'Italia, lunga circa 16 cm.

Il maschio ha la nuca color castano-rosso, le parti dorsali marroni striate di nero, ventre e guance bianchi, petto e gola neri. I giovani e le femmine hanno invece colorazione uniforme castano-brunastra e ventre grigio. Il becco, conico e robusto, è di colore grigio scuro.

Habitat e comportamento

Presente in tutta Italia, stazionaria nel vero senso della parola, in quanto non esce dal territorio delle città o dei paesi in cui è nata.

Vive quasi sempre vicino alle abitazioni, dalla pianura alla collina fino a 1.400 metri di quota, con maggiore frequenza nei centri medio-piccoli o ai margini delle grandi città, ovunque siano presenti giardini o spazi verdi idonei alla nidificazione. Insieme al piccione è una delle specie di uccelli più confidenti con l'uomo presente in città.

E' onnivora, si nutre anche delle briciole lasciate dall'uomo.

Specie molto gregaria, vive in coppie solo nel periodo della riproduzione; le coppie nidificano le une accanto alle altre formando gruppi costituiti anche da centinaia di elementi. Il nido è sferico, viene costruito dal maschio con materiali vegetali ed una entrata laterale sotto le tegole, nelle grondaie, nei camini, nelle cavità dei muri e tra i rami degli alberi.
Depone 4-5 uova, covate da entrambi genitori per 11-14 giorni, quindi nutrono insieme i piccoli che rimangono nel nido 13-14 giorni.

www.maudoc.com

www.natureblink.com

FRINGUELLO (*Fringilla coelebs*) - Chaffinch

Famiglia: Fringillidi

Caratteristiche

Può raggiungere una lunghezza di 17 cm. Il maschio presenta la fronte nera e la parte superiore della testa, la nuca ed i lati del collo grigio-azzurri; le guance, i lati della testa, la gola ed il petto tendente al ruggine, dorso color bruno-castano, parti inferiori biancastre, ali nere con macchia bianca alla base ed orlature esterne verdastre e coda nera. La femmina presenta tonalità più spente, con prevalenza di bruno e color crema, e barre bianche sulle ali molto accentuate, che permettono di distinguerla anche in volo.

Habitat e comportamento

In Italia è stanziale e molto diffuso soprattutto in autunno-inverno quando ai soggetti nostrani si aggiungono quelli di passo provenienti dal nord Europa. Durante le migrazioni vola in grossi stormi formati da individui dello stesso sesso.

Il suo habitat naturale è costituito da boschi di latifoglie e di conifere, in particolare aperti e luminosi o confinanti con radure; vive anche in campi coltivati con alberi sparsi, frutteti, orti, giardini e piazze alberate, in pianura e in montagna. In estate si spinge nelle regioni montane oltre i 2.000 metri di quota, che abbandona in inverno per raggiungere le pianure.

E' *granivoro* ovvero si nutre di semi in genere, prediligendo quelli oleosi o molli. Ricerca anche invertebrati e insetti nel periodo riproduttivo per nutrire la prole.
Il nido è costruito dalla femmina alla biforcazione dei rami, ad un'altezza tra i 3 e i 12 m dal suolo, a forma di coppa, con rami secchi, fili d'erba e muschio, ricoperto esternamente da licheni e tele di ragno in modo tale da farlo sembrare un nodo dell'albero e quindi mimetizzarlo il più possibile. La femmina vi depone 4-5 uova e le cova per 12-14 giorni; i piccoli lasciano il nido dopo il ventesimo giorno di vita.

Maschio – www.birds.it

Femmina - www.ebnitalia.it

CARDELLINO (*Carduelis carduelis*) - Goldfinch

Famiglia: Fringillidi

Caratteristiche

E' lungo circa 15 cm ed è caratterizzato da: maschera facciale rosso-arancio orlata di nero intorno al becco, parte mediana e posteriore del capo nere, tempie e guance bianche, ventre e petto bianco-grigio sfumato ai lati di nocciola, dorso bruno, ali nere con barre giallo-oro, coda nera con macchie bianche, zampe brune. Maschio e femmina sono molto simili.

Habitat e comportamento

Presente in tutta Italia, stazionario nel centro-sud, nidifica in tutte le regioni sino a un'altitudine di 800-900 metri, più numeroso in primavera e autunno per il passo di soggetti provenienti dal nord.

Essendo una specie essenzialmente arboricola vive nelle zone marginali di boschi, campagne, giardini e parchi urbani fino ad un massimo di 1.500 m di quota. Si riunisce in gruppi numerosi per svolazzare tra le fronde degli alberi.

E' una specie *granivora*, con netta preferenza per i semi di cardo, pianta da cui prende il nome. Si nutre inoltre di insetti: piccoli coleotteri, larve di lepidotteri, ditteri, afidi.

La femmina si occupa della costruzione di un nido di rami e steli ricoperto di muschio all'estremità di un ramo alto e vi depone 3-6 uova. L'incubazione dura 12-14 giorni e dopo 14-15 giorni dalla nascita i piccoli abbandonano il nido ma restano in vicinanza dei genitori anche quando questi si preparano alla seconda covata.

www.birds.it

www.ruchet.com